

¿Cuándo deben vacunarse los niños y los adolescentes?

Edad	HepB Hepatitis B	DTaP/Tdap Difteria, tétanos, tos ferina	Hib Haemophilus influenzae tipo b	Polio	PCV Neumocócica conjugada	RV Rotavirus	MMR Sarampión, paperas, rubéola	Varicela	HepA Hepatitis A	HPV Virus del papiloma humano	MCV4 Meningocócica conjugada	Influenza (Gripe)	
Al nacer	✓												
2 meses	✓ (1 a 2 meses)	✓	✓	✓	✓	✓							
4 meses	✓ ¹	✓	✓	✓	✓	✓							
6 meses	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ ²	✓ (6 a 18 meses)	✓	✓ ²						✓ ³ (se pone todos los otoños o inviernos a los niños y adolescentes entre 6 meses y 18 años de edad)	
12 meses		✓ ⁴ (15 a 18 meses)	✓		✓	✓							
15 meses					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
18 meses													
19 a 23 meses		Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵ (hasta los 5 años)		Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵					
4 a 6 años		✓		✓			✓	✓					
7 a 10 años	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵											
11 a 12 años		✓ Tdap		Ponerse al día ⁵			Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵	Ponerse al día ⁵	✓✓✓ (sólo mujeres) ⁶	✓		
13 a 18 años		Ponerse al día ⁵ (Tdap/Td)								Ponerse al día ^{5,6}	Ponerse al día ^{5,7}		

1. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna HepB a los 4 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.
2. Es posible que su bebé no necesite una dosis de la vacuna Hib ni de la vacuna RV a los 6 meses, dependiendo del tipo de vacuna que use su profesional de la salud.
3. Se recomienda una dosis para la mayoría de las personas. Los niños menores de 9 años que se van a vacunar contra la influenza por primera vez, o los que sólo recibieron 1 dosis durante la temporada anterior (si ésta fue la primera temporada en que se vacunaron), en esta temporada deben recibir 2 dosis, la segunda al menos 4 semanas después de la primera.

4. Esta dosis de DTaP se puede dar incluso a los 12 meses de edad, si pasaron 6 meses desde la dosis anterior y cree que tal vez no vuelva para más vacunas cuando su hijo tenga 18 meses de edad.
5. Si se atrasa con alguna vacuna, o se le olvida por completo, su hijo debe recibirla lo antes posible.
6. Todas las niñas y mujeres de 11 a 26 años de edad se deben vacunar con 3 dosis de la vacuna HPV, a lo largo de un período de 6 meses. (Incluso las niñas de 9 años se pueden vacunar).
7. Si tiene un adolescente que va a ir a la universidad y tiene planes de vivir en una residencia estudiantil, y no lo vacunaron antes contra la enfermedad meningocócica, se debe vacunar ahora.

Nota: Algunos niños pueden necesitar más vacunas. Hable con su profesional de la salud.